

Erectie stoornissen bij diabetes (suikerziekte)

Een erectiestoornis kan zowel een lichamelijke, als een psychologische oorzaak hebben. Bij ongeveer 25% van de patiënten met een erectiestoornissen wordt dit veroorzaakt door een psychologische factor. Bij 45% speelt zowel een psychologische als een lichamelijke oorzaak, zoals suikerziekte een rol. Bij 25% is er vrijwel alleen een lichamelijke oorzaak terwijl er bij 5% van de patiënten geen oorzaak wordt gevonden. Dat de erectie bij mannen met suikerziekte vaker problemen geeft, heeft vooral te maken met een verslechterde doorbloeding van de kleine bloedvaten. Daarnaast kunnen aantasting van de zenuwen (neuropathie) en wisselende bloedglucosewaarden een rol spelen.

Zoveel mogelijk stabiliseren van de bloedglucosewaarden.

Daarnaast is (*bij mannen**) het voorschrijven van tadalafil (Cialis®) of sildenafil (Viagra®) een optie, na een somatisch akkoord van de huisarts.

Voordeel van tadalafil is de lange halfwaardetijd van 17 uur boven sildenafil met een halfwaardetijd van 4 uur. Het is echter iets duurder dan sildenafil. Seksueel functioneren kan daarnaast door veel factoren worden beïnvloed. Mogelijk wil patiënt gebruik maken van een consult bij een seksuoloog.

Laatste revisie datum

13-03-2019

Trefwoorden:¹

Impotentie
Erectiestoornissen
Diabetes
suikerziekte

¹ © 2019 M. de Ruijter