

Obsessieve compulsieve symptomen bij clozapine

Obsessieve compulsieve symptomen (of een toename daarvan) wordt gerapporteerd bij ongeveer 10% van de patiënten die clozapine gebruiken. Er wordt gesuggereerd dat het anti-serotonerge effect van clozapine verantwoordelijk is voor dit fenomeen wat ontstaat na 1 tot 3 weken.

Behandeling

De behandeling van obsessieve compulsieve symptomen (OCD) bij clozapine kan bestaan uit een verlaging van de dosering. Daarna kan het toevoegen van een SSRI geprobeerd worden. Qua effectiviteit bestaat er geen verschil tussen de onderzochte SSRI's. Een speciale reden om voor fluvoxamine bij OCD te kiezen ontbreekt.

Omdat voor de medicamenteuze behandeling van OCD eerder hoog dan laag moet worden gedoseerd, vraagt de clozapine spiegel bij combinatie met fluvoxamine extra aandacht. De clozapine spiegel kan namelijk fors stijgen. Op grond daarvan is het advies om bij voorkeur een SSRI te kiezen met zo min mogelijk interactie met clozapine of de clozapine spiegel hierop zorgvuldig af te stemmen.

Bij de clozapine plus werkgroep is gerapporteerd dat bij een hoge dosis fluvoxamine (200 tot 300mg/dag) OCD klachten sterk kunnen verbeteren. Bij toevoeging van clomipramine aan clozapine kunnen sterke sedatie, hypotensie en anticholinerge overbelasting optreden¹.

Referenties

1. Bleakley S., Brown D., Taylor D. (2011), Does clozapine cause or worsen obsessive compulsive symptoms? An analysis and literature review. *Therapeutic Advances in Psychopharmacology*, vol. 1, no. 6, pp. 181–188, 2011.
2. Schirmbeck F., Zink M. (2012), Clozapine-induced obsessive-compulsive symptoms in schizophrenia: a critical review, *Current Neuropharmacology*, vol. 10, no. 1, pp. 88–95, 2012
3. www.clozapinepluswerkgroep.nl

Laatste revisie datum

13-02-2017

¹ © 2017 M. de Ruijter