

Vermoeidheid (sedatie) bij clozapine

Sedatie komt het meeste voor in de eerste fase van de behandeling met clozapine, dit verbeterd vaak in 4 tot 6 weken. Bij ongeveer 40% van de patiënten die clozapine gebruiken komt sedatie blijvend voor.

Behandeling

Als er comedicaatie in de vorm van benzodiazepines en slaap medicatie aanwezig is dit voorzichtig afbouwen. De grootste dosis clozapine, zo niet alle clozapine voor de nacht in nemen kan de sedatie overdag verminderen. Daarnaast is het raadzaam de clozapine langzaam op te bouwen, of waar mogelijk de dosis clozapine te verminderen op basis van het beeld en de bloedspiegel. Een laatste medicamenteuze optie is het behandelen met dextro-amfetamine.

Referenties

1. Cohen D, et al. (2012) Beyond White Blood Cell Monitoring: Screening in the Initial Phase of Clozapine Therapy. *J Clin Psychiatry* 2012;73:1307-131
2. Nielsen, J., et al. (2013). Termination of clozapine treatment due tot medical reasons: When is it warrented and how can it be avoided? *J. Clin Psychiatry*. 2013;74 (6): 606-613.

Laatste revisie datum

02-06-2016

Trefwoorden

Clozapine

Sedatie

Vermoeidheid

© 2016 M. de Ruijter GGz Centraal