

Houding ten aanzien van medicatie (10 items)

- In te vullen door de patiënt (DAI-10; verkorte versie)
-

Het doel van deze vragenlijst is om inzicht te krijgen in wat patiënten vinden van het gebruik van psychiatrische medicatie en wat hun ervaringen zijn met deze medicatie.

Lees iedere uitspraak en beslis of deze op u van toepassing is of niet. Als de uitspraak (grotendeels) **op u van toepassing** is, kruis het vakje achter de uitspraak onder **mee eens** aan. Als de uitspraak (grotendeels) **niet op u van toepassing** is, kruis het vakje achter de uitspraak onder **mee oneens** aan.

Beantwoord iedere vraag. Denk er aan **uw eigen mening** te geven – er zijn geen goede of foute antwoorden. Wacht niet te lang bij het beantwoorden van een vraag.

De medicatie waarnaar verwezen wordt in de vragen betreffen alleen **psychiatrische** medicatie.

| | Mee eens | Mee oneens |
|---|-----------------|-------------------|
| 1 Voor mij persoonlijk wegen de voordelen van medicatie op tegen de nadelen. | 0 | 0 |
| 2 Ik voel me vreemd, als een ‘zombie’, als ik medicatie gebruik. | 0 | 0 |
| 3 Ik neem medicijnen uit eigen vrije wil. | 0 | 0 |
| 4 Door medicijnen voel ik me meer ontspannen. | 0 | 0 |
| 5 Door medicatie voel ik me moe en duf. | 0 | 0 |
| 6 Ik neem medicatie alleen als ik ziek ben. | 0 | 0 |
| 7 Ik voel me normaler als ik medicatie gebruik. | 0 | 0 |
| 8 Het is onnatuurlijk voor mijn lichaam en geest om beheerst te worden door medicijnen. | 0 | 0 |
| 9 Mijn gedachten zijn helderder als ik medicatie gebruik. | 0 | 0 |
| 10 Door medicijnen te blijven gebruiken kan ik voorkomen dat ik ziek word. | 0 | 0 |

- Nederlandse vertaling Boter, Gamel, Machielsen en Weldam, 2004. .Zij die gebruik willen maken van deze vragenlijst worden verzocht contact op te nemen met: Han Boter, UMC Utrecht, afdeling psychiatrie (A01.126), Pb 85500, 3508 GA Utrecht; 030 2507132, h.boter@azu.nl
- Hogan TP, Awad AG, Eastwood R. A self-report scale predictive of drug compliance in schizophrenics: reliability and discriminative validity. Psychol Med 1983;13:177-83.